

**DISSERTATIO  
INAUGURALIS  
MEDICO-  
PRACTICA  
SISTENS...**

---

Joh. Ed Feldmann



Das menschliche Herz ist wie die Leber der ungetrüblich, es hat kein Tiefsen und Höhen, keine Klappen und Ventile. Es ist ein menschliches und physisches Verlangen nach der ungetrübten Freiheit. Jeder Mensch hat es, die Freiheit ist ein menschliches Verlangen, das es nicht sein wird; denn es ist ein Verlangen nach der Freiheit des Willens und der Seele.

Figure 1

MAGNIFICO

PERILLUSTRI AC SPECTABILI

VIRO

**ALOYSIO FIEDLER,**

MEDICINAE DOCTORI, C. R. AD TENTAMINA PUBLICA  
DELEGATO ENCLYTAE FACULTATIS MEDICAE VINDO-  
BONENSIS, DECANO EMENTO, CELEBRISSIMAE AC AN-  
TIQUISSIMAE SCIENTIARUM UNIVERSITATIS QUOS-  
DAM RECTORI MAGNIFICO

etc. etc.

V I R O

SCIENTIA, HUMANITATE, BENEVOLENTIA INSIGNE  
ET OPTIME DE SE MERITO  
DEVOTA MENTE VENERANDO ELISCE  
LITERARUM ACADEMICARUM PRIMITIAS

18

SINGULIS OBSERVANTIAE TIBERIDAM AC TIBIDAMI  
GRATISSIMI ANIMI MONUMENTUM  
OFFERT ET DEDICAT

DEVOTISSIMUS  
*EDUARDUS FELDMANN.*

---

## Proemium.

---

**G**ravi studiorum curriculo ex lege finito, artis medicæ thesaurum opulentissimum considerando æquiparandoque, cum meis eben tenellis viribus animus hæsit, quid pro dissertationis argumento seligerem. Conspectum affectionum cordis morbosarum breviter exponere a longo tempore mihi arisit. Argumentum pergrave quidem pro me tirome; ast ubi animus se promptus præbet, tentare licet vires. Cor nobilissimum est totius organismi humani organon; jam a prima hora ubi hujusce visceris momentosissimæ notio anatomica me patuit, omnem in se attentionem meam repuit, quæ Physiologiæ et Pathologiæ facie prælucente clarior facta est. Illo tempore vero, ubi clinicum sub auspiciis Celeb. summe venerandæ Consiliarii Nobilis a Raimann, et ingeniosissimi a Hildenbrand omni amore et omni cum industria

frequentatissimè, propositum meum hoc argumentum pro dissertatione seligere, adaugebatur.

Perscrutabar omnia, quae circa cordis affectiones morbosas conscripta sunt, classica quae invenì in systema aliquod logicum reducta vobis lectoribus benevolentibus præbeo. Benignis igitur accipiatis oculis opusculum immaturum, quæ primitiis studiorum meorum; quod, si tempus et vires mihi concedant expoliturus sum.

Vindobonæ 12. Maj 1831.

A u c t o r.

## Notiones generales.

*Morbus cordis adfectio vocatur cardiognus.*  
(Herzabel, Herzerkrank.)

**M**orbi cordis dividuntur in *dynamicos et organicos*; haec generalia divisio sua iterum habet species. Circa momenta diagnostica et aetiologica sequentia generatim memoranda veniunt.

Affectiones cordis morbosae originem docunt ex constitutione propria adnata vel acquisita; vulnera pectoris, pericardii, et cordis, illius camerae, vasorumque magnorum; onera pectori aut capiti imposita, cursum extravagantes, vociferatio protracta, morbi retrophi, et quidem exanthemata et impetiginos, maximum exercent influxum in prognerandis et producendis morbis cordis. Haec momenta aetiologica, quae hic generatim memorantur; ubi de speciebus vero morborum cordis loquar specialiter tractabo. Cardiogni nonnulli periodici sunt, nonnulli remittentes, alii iterum intermittentes. Dum aeger quietem observat aliqua phaenomena cardiogni evanescent, solummodo respiratio brevis et anxiosa, circulus exagitatus, pulsus frequentis magno et citato cognoscendus, persistant; quidquid autem cordis functiones aut processum pulmonum vitalem exorbitat haec phaenomena quoque exasperat; hinc in foeminis praecipue hystericis, aut

In viris hypochondria detonsa, animi pathemata quae momenta psychica pergravia, phaenomena ista morbo-  
sa exasperant; quo magis homo qui cardiogmo labo-  
rat aetate proventus est, quo plus illius temperamen-  
tum se qua temperatum et phlegmaticum praebet, eo  
minus circa aegrum periculum versatur; quo junior  
contra infelix aeger est hisce morbo-  
sis adfectionibus laborans, quo magis illius temperamentum fervidum  
aut melancholicum se manifestat eo gravior est ipse  
morbus, et eo vehementiora sunt pericula, quibus aeger  
expositus est.

Symptomata summe generalia quae fere omnibus  
cardiogm-  
is conveniunt vel initio vel in decursu sequen-  
tem exhibent imaginem.

Præcedunt plerumque inquietudo, tristitia, in  
nonnullis moeror, setus, animus in iram pronus, debae-  
scatio lipothymia, congestiones erga caput. Oculi ful-  
gent, genae rubent, frons calida, percipiuntur vertigo,  
cephalaea, tinnitus aurium, et saepissime ab aegris accu-  
satur, somnus somnis extravagantibus flagitans, aut  
vera agrypsia. Vox ranca et profunda sensus tensionis  
in laryngem accusatur, dysphagia nonnullos per dies  
aliquot vexat, et plerumque in febribus nunc frigida  
alternat cum calore, facies coloris lividi, imo nonnun-  
quam totum corpus eundem ostendit colorem. Dolo-  
res vagantes modo in extremitatibus superioribus, mo-  
do in inferioribus, in regione cordis, pectoris, levis in-  
tumescentia hepatis, ventriculi et lienis observantur.  
Respiratio brevis anxiosa et interrupta est, quae mole-  
stiae augentur, loquela, vociferatione protracta, vectio-  
ne rhedae, scalarum ascensum; adeo cardiopalmus inten-  
sus, qui in multis lipothymiam post se trahit, aeger in  
lecto neque in dextro neque in sinistro latere absque  
hisc symptomatibus decumbere valet. Amant plerum-



que in targo jacere, pectora elevato, non absit tussis ab initio sicca postea cum sputis mucososerosis sanguine striatis; haecoe tussis ab auctoribus tussis cardiacae nuncupatur, simul cum tussi anhelitus et sibilus in serie phenomenorum pulmonum adparent, suffocationis periculum post ea trahentes. Pulsus citatus irregularis magnus, aut suppressus et parvus tangitur, ante omnia excellunt gravia symptomata in organo morbo-<sup>9</sup>so ipso, pulsatio vehemens cordis ipsius ab aegro et medici manu exploranda et visu percipienda. Cum hac pulsatione sensus pressionis gravadinis, anxietatis, caloris excedentis in scrobiculo cordis aegrum edocent mali fomitem, radicare in praenobili organismi humani viscere.

Cardiogni sunt vel veri si morboosa affectio collocata est in corde ipso aut in illius pericardio; vel cardiogni sunt *spuriis* *pseudo cardiogni*, ubi laesa cordis functio, causam in aliarum partium affectione morbo-  
sa invenit.

Hoc subdividere solent in:

*Pseudo cardiognum compressarium*, ubi vitia organica aliorum organorum pressione mechanica functiones cordis perturbant.

*P. cellarem*, ubi tumores in glandulis colli in larynge in vasis jugularibus cardiopalmum causant.

*P. pectoralem*, ubi morboas affectiones pectoris, eor morbosum reddunt.

*P. abdominalem*, plerumque infectus hepatis levis glandularum mesentericarum etc. huncoe cordis morbum in lucem provocant.

*P. sympathicus*, vocatur illa morboosa cordis affectio cujus fomes in aliis visceribus organismi radica-  
tur e. g. in capite, in pectore, aut in utero, vel cre-  
tismus est, qui in omnibus functionis organismi se

manifestans, producendis hisce malis par habetur. Haec species cardiogeni in foeminis gravidis, in puellis chloroticis et in viris hypochondriacis vexatis saepe saepiusque occurrat.

## Morbi dynamici cordis.

### A. Inflammationes.

#### a) *Pericarditis.*

Velamentum cordis potentia nociva inflammatum, malum quod raro quidem per se absque cordis phlogosi occurrit, ab auctoribus nomine *Pericarditis* insignitur.

### Diagnosis.

Morbus cum febris est valida, characteris athenici originem capit, huic se associant sequentia symptomata essentialia. In regione cordis admoventur ab aegris calor excedens, sensus ardoris, gravitatis aut pressio- nis, dolores ibidem pungentes, lacerantes, fixi constan- tes, cardiopalmus vehemens irregularis palpitans, sum- mam post se trahens anxietatem; pulsatio cordis et vasorum magnorum, pulsus modo duri, citati irregu- lares modo suppressi tanguntur, singultus, inquietu- do summa; aphonia, aut vox pipiens, lipathymiae fre- quentes; situs in regione dorsali denegatus frigus cum calore alternans in extremitatibus. Aut non dia malum per se solum manet, nam per nexum organicum, sym- pathicum et vitalem quae locum habent, inter vela- mentum cordis et ipsum cor, hoc quoque organum in sphaeram inflammationis snecipitur. Oritur deinde ma- lum ratione periculosum silenti est.

## b) *Carditis.*

Morbum antecellit per diem nonnunquam febris aut valida, frigore excessivo et calore benigni alternantibus, siti inexplebili, pulsu forti, frequente irregulari, cephalaea, rubore genarum, oculis splendentibus, inflammatis; inquietudo et anxietas summa; nocte insequente, inflammatio cordis ipse cum suis symptomatibus manifestatur. Dolor sub sternum incipit ab initio obtusus, mox fit pungens, et magis magisque in cordis regione ipse adveniat ab aegro, totumque pectus doloribus angustatum adparet; facies ab initio tumescens, anxietatem et dolorem ostendit, mox rubescens mox pallida apparet, oculi splendidi nunc lacrimis suffusi, mox vitrei et fere clausi observantur. Summa fit inquietudo aegri, qui se jactat a loco ad locum, modo adtrahit pedes modo se extendit in lecto, et nullibi solatium ipsi fit in maximo dolore. Respiratio brevis citata, spasmis retenta mox abdominalis fit, gemita conjuncta absque tussi, verius tussis incitat frequentior siccis et deglutitio denegatur. Pulsatio cordis ab initio statim vehemens et citata sed regularis. Ita aut 3ta Die a vehementia multum amittit et nonnunquam plane cor tam silenti modo pulsat ut cessare videatur. Pulvis nunc duri suppressi apparent tempore vespertino magni pleni irregularesque; sub singulis insultibus parvi tanguntur. Omnis motus cordis dolorosus est, ac si vulneratum esset. Singultus quotidie bis aut pluries instant, adeo vehementia excedentes ut aeger lipothymia graviori semper post singulum insultum detineatur. Pressio in regione cordis adplicata multum mitigare videtur. Sub stethoscopio pulsationes cordis inordinatae, et frequentes percipiuntur. Nonnunquam cum carditis synsymptomata gastritis conjuncta

sunt, hinc vomitus materiae mucosae viridis, acutus doloris pungentis advenatur ab aegro in regione ventriculi. Si cor et pericardium phlogosis laborant pro signo diagnostico summi momenti est, acire dolores perstare in regione pectoris sinistra sola; si substantia cordis inflammata est, malum apud auctores sub nomine *Carditis parenchymatosa* occurrit. Quando autem membrana interna cordis phlogosi correpta est, inssequitur *carditis membranosa interna*. Si vero superficies externa hoc malo laborat, vocant *cardidem membranosam externam*. Et, si cor et pericardium inflammata sunt, *Cardiopericarditis* vocatur, morbus summe insidiosus, post paucas horas lethalem exitum post se trahens. Arteriarum magnarum inflammatio nuncupatur *Arteritis pectoralis-Arteritis*. Si venae pectoris magnae inflamae sunt: *Phlebitis pectoralis* ab auctoribus nuncupatur.

Carditis dividitur in:

1. *Substantivam* cardidem ubi causa occasionalis in cor ipsum egerat, et morbum produxit.

2. *Symptomaticam*, ubi malum reflexio alterius affectionis morbosae est, sic e. g. in vehementi pneumonia carditis nonnunquam symptomatice, exoritur.

3. *Primariam et secundariam*, qualis est *carditis metastatica*, quae sequitur exanthema aut arthritidem repressam ubi, *Carditis arthritica* vocatur.

4. *Acutam*, ubi dolores excedunt vebementia et extensioe, febrisque characteris activi est, imaginem purissimae synochae exhibens, sic plerumque vulnere graviora sequitur; si hoc malum diu durat aut perverse tractatur oritur carditis, quae vocatur

5. *Carditis chronica*, Plerumque sequela est morborum organicorum cordis, aut vasorum magnorum, aut acuta infeliciter superacta adparet. Assant plerum-

que decubitus lectum, cuius symptomata sequentem exhibent medico practico imaginem. Sicuti in carditide acuta, sed vehementiae et extenuitate mitigata anxietas et inquietudo vexant infelicem aegrotum, edent sensus pressionis et doloris in regione cordis, et dolores persistentes, fixi, constantes, praesertim post decubitus in latere sinistram, post prandium, spirituosorum usum, animi pathemata excitantia, sicuti irem, gaudium, et spem (qua talia habenda) multum adanguntur. Pulsationes cordis, sub omni respectu frequentiores et majoris extenuitatis sunt. Febris nonnunquam nulle adest, et aeger extra lectum ambulare valet.

Porro dividunt carditidem 1) in *phlegmonosam*; 2) *rheumaticam*; 3) *simplicem et compositam*; 4) et in *simplicem*; quae denominationes indolem enim jam per se involvant.

## B. Cerebrae.

*Hydrops pericardii, Hydropericardis.* (Die Wasserucht des Herzbeutels.)

Morbus huius frequentissime occurrit, cum hydropse pulmonum quam maxime conjunctus, symptomata sua quae succincte morbi lethalis imaginem representant sequentia sunt: Sensus peremguae anxietatis, praecipue si aeger conatur motus instituere et vult in latere dextro decumbere. Pressionis sensus et gravitatis in regione cordis, sensus contractionis in corde ipso, ut se ei in fluido quodam nataret, pulsatio cordis et motus tremulosi huius organi; insultos pericardici lipothimiae cum suffocationis metu, facies livida tumida, tossis brevis sicca, pulsus irregularis, accelerati nonnunquam parvi, retardati, molles, in genere simulantes, medico se representant. Congestiones verius encephalon,

sensus aurium, vertigo, pulsatio articularum facilius, sitis modica, urinae parvae.

Morbus iste qui malum primarium apparet, rarissime simplex, nonnunquam celerrime pereurit, nonnunquam leuitem amat decursum; timendum est hocce malum si corditis apparatu antiphlogistico mobiliori, peritum tractata est; aut neglecta non in initio statim in summa sua extensione adhaerebat. Huius symptomatibus prius recensitis morbus nonnunquam diu perdurat, et aegri periodos habent, ubi morbus mitigatus apparet; Ad aëre humido malum denno exasperatur, anxietas et sensus oppressivus augentur, tumores partium cordis vicinarum incrementum; noctes sunt intolerabiles, totum corpus hydropice magis magisque intumescit; febris hectica exoritur, sensus ardoris in pectore augeatur, sudores colligantur, diarrhoea purulenta appareat, aeger valet in situ erecto se retinere, vel in unum alterumque latus micromis statum tollerare, tussis vero frequentior cum spulis purulentis, sanguine striatis, foetentibus, et lipethymias micram suscipiunt ab hora in horam, donec vel apoplexia, vel suffocatio, tristem morbi scenam claudit cum suis phenomenon nulla arte superandis.

### C. Neuroses.

#### *Cardiopalmus, palpitatio cordis. (Herzflappen)*

Cardiopalmus grave cordis adfecti signum, debet distingui in:

1. *Pulsationem cardiacam (Herzflappen.)*
2. *Palpitationem cordis (Herzpoßten.)*
3. *Trepidationem cordis (Herzjappeln.)*

1. *De pulsatione cardiacæ.* Pulsatio cardiaca est motus cordis ab auribus sensibus, auditus et tactus, percipi-

péndus. In comparatione cum pulsu cordis, qui in opeditione normali vix audiri et percipitur, rhythmum excedit.

Hæc æquatio semper percipitur in regione cordis, sub stethoscopio pulsationes intensitate et extensione adauctæ apparent.

Pulsatio cardiaca vel est *sympathica*, hæc dependet a propria, abnormi affectione systematis vasorum et nervorum, et quamvis motus vivax est, atamen non turbulensque, semperque hinc, motus quæ regularis apparet; absque associatione molestiæ et anxietatis magna. Concordat cum pulsu qui semper irregularis modo magis, modo parvus, aut intermittens tangitur, ista pulsatio dependet plerumque a causis transitoriis, hinc etiam *pulsatio cardiaca transitoria* vocanda.

*Pulsatio cardiaca*, quæ *neuropathica* sive *spasmodica* vocatur, plerumque a vitis organicis localibus, dependet; æquatioque dolorifica sæpius exultat, semper irregularis impetiosa et continua est, non concordat cum pulsu, certi motus corporis illam excitant, alii ameliorant. Si pulsatio cardiaca localis associata est *inflammationi*, deinde semper cum dolore conjuncta procedit. Si cum *spasmo* connexa est, deinde facile intermittens anas typum, in *molle organice*, quæ morbus chronicus se representat.

In *cardiogenia* ubi abnormis cordis æquatio, se prodit, poliationem plerumque observamus, propriam excitantem, sensationem morbosam, venientem anxietatem, vertiginem, tremorem artuum, et hyposthyniam. Hæc omnia sub quiete corporis remittunt, sub accensu autem scalarum, functionibus sexualibus exercitiis, sub stimulis, sub influxu animi pathematibus depressivum et excitantium adaugentur.

2. *Pulsatio cordis palpitans*, sive palpitatio cor-

dis nihil aliud est nisi adaequa pulsatio vi singulari cordis, quae ita respectu temporis et loci deviat a rythmo normali, ut ipsae costas nunquam in ambitu majori elevet; aliquando cor quiescere adparet, ut modo vi intensius adaequa pulsat, et pulsus caeteros cordis irregulares reddit.

3. *Pulsatio cordis trepidans*, sive cordis trepidatio, in hoc malo gravissimo, pulsatio cordis abnormis apparet, quoad vim, celeritatem et rythmum regularem. Est hoc symptoma non propria cordis pulsatio, cor non sursum et deorsum se movet, sed lateralem emat irregularem, aut trepidantem motum, imo aliquando cor vibrare videtur, quod auctoribus etiam *vibratio cordis* vocatur; aut pulsationes nunquam silent, hinc *apixia cordis*; alias iterum sub qualibet systole cordis stridorem aut susurrum percipiunt aegri, hinc *stridor cordis oritur*; vel cor tremorem excitare videtur sub pulsationibus inde *tremor cordis*, *Cardiastromes*, (*Chrypsis*) nominatur.

Haec omnia sunt mala cordis, quae apud auctores et medicos practicos, sub titulo *nevrosum* comprehenduntur; ante ad mala cordis organica transeo.

## Morbi organici cordis.

### *Aneurysma cordis, vasorumque magnorum.*

Lente oritur haec malum, quod non solummodo ad cor restringitur, sed et ad vasa illius majora aorta, et vena pulmonalis sunt reflectitur, et symptomata aneurysmatum horum vasorum confusum cum signis morbosae ejusdem affectionis morbosae cordis ipsius, ideo omnia quae de cordis aneurysmate specialim referuntur, non indiscriminatum de hoc solo mor-



bo valent. Exeritur vero sæpe cum doloribus vagantibus a collo incipientibus ad, extremitates decurrentibus. Adest pulsatio quæ percipitur in pectore simul cum illis doloribus vagantibus, cum hac deinde sensitio doloribus constringens, quæ a scrobiculo cordis incipiens, ad collum et claviculas extenditur. Nonnunquam et antibrachia vexantur, hisque symptomatibus morboſis adſociantur adhuc vertigo, cephalæa, congestiones verus encephaloq, facies livida, somnus æmula terribilibus interruptus, phantasmagoria. Paulo post pulsatio cordis sat vehemens percipitur, sensus ardens in regione cordis, anxietas summa, tussis suffocativa; tales insultus quo longius morbus durat eo frequentiores exardescunt. Sub quiete in situ dorsali pulsatio multo minor presentitur, pulsus fortes pleui tanguntur, insultus dein quotidie reiterantur, et sub fine lethali pluribus vicibus vexant miserum una die.

Hæc sunt symptomata summa generalia aneurysmatis pectoris (Erweiterung des Herzes.)

Speciatim hic memoranda veniunt:

Dilatatio cordis, Cardiacurysma, (Erweiterung der Herzhöhle.)

Nonnunquam adeo ventriculi cordis extenduntur, ut fere triplicem in se contineant ambitum cordis convexi. Pulsatio et sensitio dolorifica etiam in hac cordis affectione in corde ipso incipit. Mox vero a sphaera mali symptomata morboſa in omnem directionem sese extendunt; respiratio anxie citata, thorax hæret, pulsatio cordis et palpitatio prominent æger sordidum liquidum aliquod calidum in corde movere refert alius, quod sordidum silente paroxismo iterum defloſare narrat. Trepidans pulsatio presentitur circo finem cujuscunque insultus, et æger æquæ sensitum ac si plures cordes

possideres; aliquando ille hæmopticus fit, et sub tussis fere convulsiva sanguinem laete rubentem efficit.

Si autem aneurysma in aorta, aut in vena pulmonali adest, prioribus sequentia esse adiciunt symptomata; palpitatio cordis magis magisque augetur, et ipsa pulsatio adeo vehemens percipitur ut integumenta circa aegrum et illius membra adcolit. Incensans insulta symptomata encephalitidis in conspectum veniunt, pulsant carotides, sub stethoscopia percipiuntur magnae pulsationes quam maxima in regione cordis ipsa, subillis ventriculorum percipitur, sub quiete pulsus mollis, undans, debilis, nonnunquam parvus et regularis, si non aorta simul cum corde hoc male laborat; tussicula saepe cum spatis cruentis, lipothymiaeque frequentiores instant. Sub stethoscopia percipiuntur pulsationes cordis fortiores sub clavicula, et in regione axillari, quam in scrobiculo cordis, contractionesque ventriculorum sunt sonorae; haec ultima symptomata, tunc praecipue caput extollunt si aneurysma cordis *parvum* est. (Erweiterung mit Verhärtung). Si totum cor dilatatum est, pro signo diagnostico valet quod pulsatio per totum pectoris ambitum presentietur. Symptomata morboza aliquando adeo variant, ut morbi diagnosis valde ambigua statueretur, praesertim si dextrum ventriculum tenuius redditur, et sinistrum induratur.

Aneurysmata interna quandoque raro quidem sed tamen et externa sunt, esse tunc topica destruendo, in conspectum veniunt. Clarissimus medicus practicus Magnusus Fiedler singulari humanitate casum observandi mihi superrime occasionem praebuit, cuius hic memorari mihi licitum est.

Aneurysma aortae ascendentis in viro 51 annorum, mensis Januarii h. a. dolore ad sternum, per 3—4 sep-

timensae prementis, pungentis, urentis et fortiter pulsantis ac prodens, sub initio Februarii externe quoque in loco designate sempe sterno magnitudine nucis avellanas apparuit, et per sequentes 6—7 septimanas ad illam capitis infantilis inotrescebat; sicque aneurysma in penetralia interna esse excludens, illius rupturam mira et celerissima ratione vitae miseræ finem imposuit.

In Sectione cadaveris invenimus tumorem ab aorta ascendente formatum jam collapsum, interne ad regionem axillarem et scrobiculam cordis usque esse extendentem, externe in regione sternali vidimus sub pressione in illius circumferentia, foramen magnitudinis imperialis magni, et resolutis tegumentis externis, serratisque costis, clavicolaeque dextri sinistrique lateris reposita, serum sanguinis circa libram deducere conspeximus, praeterea magnam quantitatem coaguli in ipso pectore; reposita nunc pariete anteriore pectoris, saccum aneurysmatis ruptum, adhuc sanguine coagulato et parvis particulis ossis impletum tetigimus.

Partes degeneratae simul cum corde Museo pathologico tradebantur; historia vero totius morbi, exactius et fusius eoque tempore elaborabitur.

### Coarctationes aegrii cordis, et illius vasorum.

Insidius hujus mali summi periculosi repente invadunt aegrum. Pulsatio cordis est vehemens omni motu adaugenda, cardiopalmus permagnus chyanosis, tumis cum spntis cruentis, epistaxis. Pedetentim incrementum sensus pressivi in regione cordis, lipothymia suscipit lipothymiam. Quando ventriculum cordis sinistrum morbo laborat omnia symptomata essentialia

cordis in latere sinistro percipiuntur; sensus plenitudinis ardoris, pulsatio irregularis, praesertim in manu sinistra irregularis tangitur pulsus, undosi, nunquam magni. Si *aorta coarctata est*, deinde omnia symptomata quae aortae affectioni morbosae conveniunt medico se repraesentant, sic pulsatio cordis frequentior, fortior, pulsus magis irregularis. Morbus vero, qui radicem in auricula dextra figat, tunc omnia haec symptomata enarrata in hac parte provocat valvula coarctatis, sub quieto tunc modica, sub paroxismo autem irregularis, turbulenta, observatur actio cordis et pulmonum. Et quando valvulae mitrales coarctatae sunt et illarum coarctatio excedit percipiuntur motus tremuli, susurros et sensus quam catuli edunt; sub stethoscopio quod hic summi momenti esse dicitur pro medico practico, sonus longius amat tempus, quam in statu sano.

Ad vitia porro organica pertinent adhuc sequentia; primo loquar de, *Ruptura cordis* (Cardiorrhexia) vocata. Hoc malum invenitur in hominibus, qui dilationem cordis passi sunt. Quod fit plerumque oneribus gravioribus capiti impositis; animi pathematibus deprimentibus diu homines adfligantibus uti sunt, metus, ira, timor, etiam intinera per pedes longius continuata, hocce malum prodere valent. Eo autem memento, ubi miser rupturam cordis patitur, sequitur facies hypochondriaca, conscientia deletur; si ventriculus dexter, rumpitur pulsus magnus et regulares tanguntur. Nunquam effectus tam cito non est lethalis, et sanguis pedetentim fluit in pericardium, cui dolor obtusus subsequitur, sensus pressionis sub sternum adest, summa anxietas observatur, et pulsus irregularis tangitur. Eadem sunt sequelae, si aorta rumpitur, quod post aneurismata occurrere solet. Eadem

sunt quoque symptomata in cordis vulneribus, semper vulnera incompleta rursus aperiantur, respiratio ab accumulatum sanguinem stertoros, abdominalia, observatur. Aliquando iterum id, ut partes tendineae cordis vulneratioque laedantur, tunc statim insequuntur inquietudo, summa anxietas, aeger non valet sedere aut jacere, dolor utique in loco cordis ubi vulnus addictum est, sed absque symptomatibus inflammationis verae cordis, absque tunc cum sputis cruentis, quae sputa in maiore laesione cordis semper observantur; pulsum parvum et durum tangitur, pulsatio cordis permagis et fortis, mox oedemata, matiusque suffocationis aegritudo crescant, et sub delirio miser vitae fungitur.

Aliud vitium organicum cordis est, *concretio cordis cum pericardio*; quando concretio simplex est, symptomata minoris tamen gradus; sed si illa completa est, deinde pulsatio cordis vehemens observatur, et majoris extensionis est, ac in quolibet cordis vitio, sensibus externis visu et auditu haec pulsatio percipienda.

Sub quolibet systole thorax vehementer concutitur et si sub diastole manus cor tangit, letum non adeo levem percipit illud instrumentum. Aeger multum et animâ velocitate loquitur, et sub loquela silest pro momento dolor, dolores trahentes edunt in regione cordis et ventriculi, ab initio summa anxietas et desperatio; ubi pulsatio valde exorbitata est, pulsum irregularis, tremuli tanguntur, faciesque livida apparet.

Etiam tumores, *excrecentiae* in corda ipso, in pericardio, aut in vasis maioribus tactu inveniuntur, quae vitia occurrunt plerumque, in individuis cachecticis, lucem vanitatem perpensis. Nonnunquam in dispositis obesitas pectoralis simplex observatur; tu-

morbo praecedit plerumque cardiacus palpitatio cordis, palpitatio irregularis. *Polypum cordis* annunciant omnia symptomata concretionis cordis, semina doloribus in illo, semina pressione, cardiopalmus excedens palpitatio permagna et animi inquietudo cum anxietate etc.

*Polypus* serus productum tremulationis est. Per ligamento cum vicinis partibus connectitur, nonnunquam variam exhibet formam, modo albus, flavus, modo lardaceus, modo carneus, modo mollis, modo durus; modo sanguinolentus, modo hydatidibus concretus. Haec omnia sectiones cadaverum nos edocent.

*Polypus purius*, nihil aliud est nisi sanguis coagulatus massam aliquam organicam simulans, plerumque in ventriculis et vasis maioribus observandus, modo sanguinis colorem lacte rubrum ostendens; modo membrana cartilaginea obductus. Plerumque exoritur sub morte vel ante mortem, sed saepe post illam, et fere in omnibus invenitur cadaveribus quo productum resolutionis.

## I. Aetiologia, Prognosis, et Therapia inflammationum cordis.

Omnes causes occasionales quae carditidem producunt, etiam gangraenae pericarditidis iuniores ferunt; nam intimus nexus organicus et vitalis, qualis est inter pericardium et organum centrale uti cor, hoc jam per se clarum reddit. Secundum sententiam immortalis a Kreysig, ibi carditis oritur, ubi synocha cum frequenti pulsatione cordis et articularum occurrit, ubi respiratio normam valde excedit, ubi aestus, etiam summe anxietatis et inquietudinisegram vexant, vel ubi in morbo febrili statim ab initio adpectus aegri e

physiognomia quae ipsi sane convenit a rythmo normali aberrat.

*Omnes causas coarctantes*, quae generatione inflammationem producendae parae sunt, et carditidem progenerare valent; a. g. omnes vulnerationes per res mechanicas inductae, vel cordi, illa a pericardio, pectore, aut costis retrogressis.

Summa anxietas qualis oritur sub inflexu maligno animi pathematum deprimentium, timore, poenitentia, ira. Narratur a celeberrimo Zimmermann quod in Polonia in carcere reclusis, a decem, sex carditide laborabant ex summa anxietate.

Refert classicus Historiographus inter illos homines, qui eius servitio navali (Galeis) castigantur, plerumque antequam iudicium latum sit a iudicibus, plures carditide laborare, nam timeant mortis capitis daminari. Videmus quantum et qualem influxum animi pathemata in vitam somaticam et psychicam exercent, qui quondam clarius perspectus, et sicuti sanitatem conservat, vitamque hilarem facit, sic at homines disposuit ad morbos.

Porro producant carditidem *exanthemata retro-pulsa*, haemorrhagiae praecoces suppressae, sudores in consuetudinem sanitatis jam cessantes retro-pulsi, diathesis peculiaris scrophulosa, aut arthritica etc.

Quoad prophetiam medicam circa hunc morbum, imaginem ipsius morbi lectoribus representantur decidero, unde periculum summum quod circa aegrum haecce malo tentatum versatur, quam maxime illis cluceat. Est carditis morbus qui citissime studia absolvere amat, qui omni novumquam ex parte medici oppositae modelae pertinaciter resistens, infestum exitum eligere festinat.

Nam in corde ubi fomes vitae radicatur, coque-

cum esset medico nonnunquam morbum superare, attamen male postuma, sicuti concretio, induratio atriorum, vasorum magnorum, valvularum, *phlebitis cordis*, *Hydropsis* timenda et difficillime devincenda sunt.

Resolutio si sequatur, semper die prima ipsa aut prima medico illam salutare licet. Sub tali decursu febris et inflammatio recedunt vehementia et extensitate, evacuationesque criticae per sudores et urinas factum parant exitum: Inter morbos postumos, in quos quem maxime corditis transire amat coarctatio occurrit, vel atriorum vel camerae cordis ipsius, vel pericardii cum toto corde, vel solummodo cum atris, vel tandem cum basi. Hoc novo malo exorto, gravissima in lucem provocantur symptomata morbose.

Methodo antiphlogistica generosiori quam opus esset adhibito, aut aegri viribus jam ante morbum valde debilitatis, aut turbata crisi per sudores, *Hydropsis* qua corditis sequela obsecratur. Rarissime vero superatio a practico refertur.

Therapia sicuti in omnibus inflammatoriis adfectionibus, methodum sibi exposcit antiphlogisticam, generosiorem, morbi naturae, formae, gradui, stadio, et aegri sexui, temperamento, dispositioni et influxibus, sub quibus vocatur coarctis, tempore, annique temporis, nec adu genio epidemico, summe omni que ex parte conveniens.

Venaesectiones primum locum hic occupant, et quidem largiori manu, praesertim ab initio ubi tali ratione et aegri viribus parcat. Cum venaesectionibus et remediis interna antiphlogistica dispositis et emollientia, cum solventibus combinata conjungi oportet. Hinc *saler medii* et *acetri*, *Nitrum*, *Cremor tartari*, *Sal amarus*, *Carbonis Magnesiac*, *Sulfas*



*Magnesianae*, Decocta ex radicibus *Gramminis*, *Aliciae* etc. *Oxymel simplex*, *Syrupus Rubi Idæi* optime qua corrigantia, febreorem et turgorem in organismo praesentes, sedantia, cum nominata remediis conjunguntur. Cum hiis remediis enemata ex aqua tepida cum oleo aut paucillo selis adhibenda sunt.

Tali ratione omnibus, quae ratio ex experientia adplicare suadent adplicatis, si vere contingat medicus morbum gravissimum superare studebit.

Si morbus non genuinus est, si evacuationes criticae suppressae, causae sunt, has remediis adeoquantis revocare prima erit indicatio.

Repressis vero exanthematibus, aut impetiginibus praecocius sanatis, in prognosi horum malorum locata est cura aegri. Medicus victor de morbo et si aeger in convalescentiae stadio versatur, caute deinceps ab illo evitandae sunt omnes causae occasionales, quae morbi genesi favent; huc referuntur omnia momenta, quae sub titulo aetiologiae recensui. Nunc et viribus debilitatis succurrere medici et aegri officium, quod remediis tonico-solventibus, diacta, congruentis, et regimine animi homogeneo acquiritur. Summa attentio ex parte medici in regimen animi vertenda est; nam simplicissimis animi pathematibus deprimentibus aut exorbitantibus, malum jam superatum, nova ratione extollere caput observant practici; ex parte aegri nimis medici in psychiatricam curam, optime illius religionis et rationis sufficitur.

## II. Aetiologia, Prognosis et Therapia cachexiarum cordis, et in specie Hydrocordiae.

Hydrocardiam provocare valent omnes causae occasionales, quae exhalationem, resorptionem excedentem reddunt; tales sunt:

a) Suppressio transpirationis cutaneae, praesertim in pectore et in regione axillari.

b) Suppressio urinae fluxus, diabetes melites, diarrhae chronicae, haemorrhoeae etc.

c) Plethora universalis, et suppressio excretionum in salutem hominis jam cedentium. Catamenia retro-pulsis, frigore, aut acimi pathematum imminutio, fluxus haemorrhoidalium suppressio; nonnunquam micribus diebus durantibus sanatis, praesertim in pectore in brachiis, hydracardiam oriri observarunt medici practici.

d) Metastaticae originis observatur quoque hydrocardia, impetigiosis aut exanthematibus uti: variolis, morbillis, scarlatina, rubella etc. regressis, aut in stadio exsiccationis sudore fugato inflammationis pericardii, cordis, pleurae, pulmonum, et phlogosae in organis a centrali organo remotis reflectuntur in cor, et malum pathema hydropericardii reliqua.

Magnam dispositionem ad hunc morbum ostendunt juvenes et puellas circa aetatem pubertatis versantes, sexus foemineus, ubi praevaletem actionem vitalem, in systemate lymphatico.

Ad causas mere exstantes pertinet aer humidus frigidus, domicilia tali atmosphaera impleta, victus corruptus, vita sedentaria, animi pathemata deprimentia, jactura humorum nobilium, per sanguinem et sudores, praecipue abusus remedium purgantium, indurationes organorum assimilationi destinatorum; ubi tempore inflammationes chronicae oriuntur, et earum sequelae operatio praesertim hepatis et lienis.

Circa prognosim referenda veniunt: aeger sanitatem ex hoc morbo recuperabit, quando morbus non est gradus altioris, et illius vires non penitus exhaustae, si duratio morbi non perlonga, si ex parte medici omnia conferantur ad conservandam pristinam sa-

nitatem quas summopere necessaria sunt, vel si recto tempore punctura adhiberetur, quod in pluribus casibus, rebus fere omnibus concludenda sit in perniciem aegri.

Hydrocardia amat transire in cachexias varias, et plerumque in tubas et phytosa.

Respiratio brevis citata, tussis sicca brevis circumtus agitata in hydrocardia, inflammatum praeparant aegro exitum; hydrocardia quae originem repetit ex aneurysmatibus ossificationibus ab scirrho insanabilis est.

Deliria, vertigo, sitis inexplebilis et petechiae instantem indicant mortem.

Circa therapiam commemoranda haec veniunt; si hydrocardia characteris activi est, quae sequela mali inflammatorii considerata venit, hic adhuc methodos antiphlogisticae naturae origini et gradui morbi conveniens adhibendus erit, hinc *Nitrum*, *Cremor tartari*, *Digitalis*, *Calomel*, *Scilla*, *vesicantis ad pectus, nucham, et raras cum decoctis Ononidis Graminis, Tarantuli etc.* applicanda sunt.

Et quando hiis remediis-adhibitis, urinae copiosae sunt, pectoris symptomata morboea imminuuntur prognosis certe faustior statuenda erit.

Nonnunquam diagnosi respectu loci ubi aqua accumulata est, certiore reddita, paracenthesis optimum sistit remedium.

*Hydrocardia chronica*, remedia diuretica quae principalia sibi exposcit; uti sunt *Ononis*, *Juniperus*, *Scilla*, *Radix senegae*, *Digitalis*, *Calomel*, *Aqua Lauracerasi*, *Extractum Lactuae*, *Scarlatiae*; *Calchicum autumnale*, *Spiritus Salsi Ammoniaci aquosus*, *Soda carbonica*, cum aceto Squillae saturata, *Pescicantis*, cucurbitarum applicatis ad pectus inan-

*etiones cum angustis Aconitidis etc. haec remedia, regimina cetero congruente, etiam non modicum male adferant, attamen optimam saepe efficiunt curam palliativam.*

### III. Aetiologia, Prognosis et Therapia nervosium cordis.

*Ad cardiopalmum dispositi sunt homines debiles habitu nervoso praediti, irritabiles, puellae chloroticae, foeminae hystericae, viri plethorici et etiam infantes helminthiasis laborantes. Causae quae cardiopalmum majoris gradus provocare valent, sunt asperissimae animi pathemata excitantia et deprimentia, quae principem sibi hic vindicant locum, et non raro graviora; quid memoro de gaudiis et spe inopinata, quid dico de timore, de tristitia, quae in dispositis inevitabilem cardiopalmum producant; hinc homines melancholici periodicos laborant cardiopalmo. Huc quoque vitia organica cordis, aneurysmata, ossificationes, coarctiones; polypi etc. numeranda sunt.*

*Prognosis in cardiopalmo, ex malis mechanicis exacte, tristis est, in foeminis vero hysterica, in puellis chloroticis, saevior statucenda.*

*Therapia jubet causam occasionalem auferre, morbum primarium sanare, vel, si hoc statim fieri nequeat, illius symptomata morbose ad minimum mitigare oportet; hinc requiruntur, quies animi et corporis, remotio omnium stimulorum in systema vasorum; remedia anaphlogistica refrigerantia circulum exagitatum petentia, nec non alvum leniter moventia. Nonnunquam Venaesectio aut hydropneum adplicatio, medici scopo respondet. *Colomet*, *Digitalis*, *Extractum Hyoscyami cum emulsione amygdalina*. *Elisir acidi Halleri cum cyrape grata*, a practico quam maxima*

laudantur. *Percussiones* plerumque adhibentur si vitium organicum in cavo mali est. Sive horizontalia vel ad dextrum latus, sub insultu non negligenda. Ab aliis uti ab Frank, Reil, et Kreisig lotiones frigidae in sinistro latere laudantur.

#### IV. Aetiologia, Prognosis et Therapia morborum cordis organicorum.

Morborum organicorum causas, occasionales adlatus, non alias invenio, nisi eas quae jam sub titulo *morborum dynamicorum* saepe saepiusque recensui, exceptis vulneribus, quae propriis acie gravioribus originem debent e. g. *armis igniromis*; haec autem iterum prognosim tristissimam admittunt, et therapiam sibi exposcunt, quae symptomatibus eminentibus quadrabit. Mala organica cordis sicuti aneurysma, atriorum, et vasorum magnorum dilatio, eorundem partium concretio, induratio, mollities, ossificatio, ruptura et polypi quae omnia mala etiam ex causa mera dynamicis oriri possunt, sicuti celeb. Nub. a Reimann, Kreysig, Tasts, alique ingeniosi practici in pluribus casibus observabant. Plerumque inflammationes chronicae, saepe neglectae, in causa sunt, quae futuram praeparant destructionem organi mobilissimi. Prognosis in omnibus malis organicis cordis ex hac ratione semper arctissimis limitibus circumscribenda est, nam malum organicum unum facillime in alterum transit, sic ex dilatactione concretio fit, ex hac induratio, et ex ista polypus evolvitur; talibus autem sub conditionibus rerum, ex parte medici cura nulla alia nisi palliativa applicanda erit. Hinc aeger in lecto retinendus, singuli insultus remedia partim antiphlogistica, partim sedantibus circulum paccantibus

curandi sunt; laudatur praeterea *Rad. Gremialis, Tarsasi, Cremer tart., Carb. Mag. Opium, Hyosciamus, Digitalis, Aqua Laurecerasi* etc.; in dilatatione vero et praevallente massa sanguinis, venesectiones larga manu institutas quadrant in medici suum. Dantur caesa ubi aegri vitio organico cordis vexati, sicuti polypo, incipiente induratione etc. cura magis diathetica vita in diem procrastinatur; hinc *laborer et motus corporis*, quibus circulatio incitatur, accelleratur, congestiones provocantur; semper vitanda veniunt; *animi motus deprimentes* vero, quorum summus uti dixi, influxus in hoc organon est, quam maxime fugiendi sunt. *Pietus quantitate aut qualitate potens*, circulo incitando, febrim praesentem magis incendat, hinc sit facile digesta, vegetabilis animali praefereendus, nunquam quantitate magna; potius sit diluens aquosus, alvus plerumque tarda sollicitanda per enemata simplicia aut cum pauxillo sale culinari et oleo, interne vero per remedia anaphlogistica solventia leniter evacuantia, uti sunt: *Rad. Gramm. Tarax. Prunae, Menna, Tamarindi, Julep auri*. Cum hoc regimine diathetico et pharmaceutico regimen mentis et animi omni industria a medico instituendum sit qui semper reminiscatur sententiae immortalis *Pä. Cor. Herimann*, dilectissimi usque ad cineres venerandi professoris mei:

„*Conditio morbi insensibilis non raro relativa est, et decrescit, qua medici ars et scientia incrementum.*“

---

---

L i t e r a t u r a.

---

- Albertini, de affectionibus cordis. Venet. 1608.  
 Senac Traité de la structure du coeur, de son action et de ses maladies. Paris 1749.  
 Percier, Inst. med. pract. Vol. II.  
 Corvisart, sur les maladies et les lésions organiques du coeur, et des gros vaisseaux P. Boreau. Paris 1806.  
 Testa, Ueber die Krankheiten des Herzes, Uebers. aus dem Englischen von L. Sprengel. Halle 1813.  
 A. Burns. Von einigen der häufigsten und wichtigsten Herzkrantheiten. Zengo 1813.  
 F. L. Kreyzig. Die Krankheiten des Herzes systematisch bearbeitet u. f. m. 4 Theile. Berlin 1813 u. 4. Englischen von Hoff 1814.  
 Laennec. Traité de l'auscultation med. etc. Tom. II.  
 P. Frank }  
 S. G. Vogel } In ihrem praktischen Werken.  
 C. Sprengel. }  
 B. de Stoark. Annus medicus Tom. 1.
-

## THESES.

### I.

Notio vitæ sicuti mortis nos penitus latet.

### II.

Natura est unica et æterna harmonia.

### III.

Influxus Cosmici morbos generare et auferre æminuere valent.

### IV.

Diagnosi non fundatæ nulla therapia nisi mens empirica superstrui potest.

### V.

Aneurysma cordis morbum insanabilem claudit.

### VI.

Emeticum in apoplexia remedium anceps manet.

### VII.

Serum lactis in incipiente phthisi est remedium anceps.

### VIII.

Non datur corticis peruvianæ surrogatum.

### IX.

Fuentes medicinas practicæ neque sola experientia nec ratio esse potest.

### X.

Medicum, qui feminas curare studet mulierem, scire, et agere oportet.

### XI.

Non omne animi pathema morbum producit.

### XII.

Lactatio lex naturæ sanctissima est, ac non omnino feminæ contedenda.

### XIII.

Digestio respiratori opposita est.

### XIV.

Collegia laureatæ, experientiæ medicæ creat.

### XV.

Non dantur remedia prophylactica contra typhoidem.

---



---

**Non scholae sed vitae discimus.**

---

SS 344067